



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.02.2011

г. Томск

№ 58

О внесении изменения в приказ Департамента здравоохранения Томской области от 04.02.2011 «Об организации наблюдения за лицами, имевшими контакт с больными корью»

В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости корью в г. Томске и Томской области и во исполнение протоколов совещания комиссии по предупреждению распространения кори в г. Томске и Томской области от 04.02.2011г и 07.02.2011, в рамках своих полномочий

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 . Дополнить п. 1 приказа пп. 3, 4 и 5 следующего содержания:

«3) организовать медицинское наблюдение за лицами, имевшими контакт с больным корью, в течение 21 дня с момента контакта;

4) обеспечить соблюдение необходимого противоэпидемического режима в стационаре с целью предупреждения внутрибольничного распространения кори как среди персонала, так и среди пациентов;

5) организовать в кратчайшие сроки вакцинацию против кори медицинского персонала ОГУЗ «Томская областная клиническая больница».».

2 . Дополнить п. 3 приказа пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 следующего содержания:

«3) обеспечить госпитализацию больных с корью: в г. Томске и Томском районе взрослых в инфекционное отделение МКЛПМУ «Городская больница № 3», детей в МЛПМУ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева»; в районах области – в инфекционные отделения соответствующих муниципальных учреждений здравоохранения Томской области;

4) в срок до 08.02.2011 года в г. Томске и до 10.02.2010 в районах области провести углубленный анализ фактического состояния иммунизации детей и взрослых против кори (в разрезе муниципальных образований, лечебно-профилактических учреждений, терапевтических, педиатрических участков, групп риска, обратив особое внимание на медицинских работников, педагогов, студентов и мигрантов), приняв необходимые меры по обеспечению достоверности представляемых данных;

5) в срок до 11.02.2010 провести корректировку планов профилактических прививок населения против кори на 2011 год в рамках национального календаря профилактических прививок с учетом проведенного анализа;

6) организовать проведение обучающих семинаров для медицинских работников по клинике, диагностике и профилактике кори;

7) совместно с учреждениями Управления Роспотребнадзора и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» своевременно проводить полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при возникновении очагов кори в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов;

8) организовать рейды в местах возможной дислокации мигрантов с целью выявления больных корью и не привитых против кори;

9) информацию о ходе вакцинации направлять в ежедневном режиме главному внештатному специалисту-инфекционисту М.Н. Добкиной domar69@mail.ru ».

3. Дополнить приказ п. 3-1 следующего содержания:

«3-1. Утвердить алгоритмы проведения экстренной вакцинопрофилактики кори (приложение)».

4. Дополнить приказ п. 3-2 следующего содержания:

«3-2. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения в срок до 10.02.2011 представить в Департамент здравоохранения Томской области главному внештатному специалисту-инфекционисту М.Н. Добкиной (domar69@mail.ru) информацию о необходимом количестве вакцины для проведения иммунизации против кори медицинских работников подведомственных учреждений.

5. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя начальника департамента по лечебно-профилактической работе Е.Л. Тимошину.

И.о. начальника департамента

Е.Л. Тимошина

М.Н. Добкина
471018

Алгоритм проведения экстренной вакцинопрофилактики против кори.

1. Первоочередной вакцинации подлежат:
 - 1) Контактные лица из очагов заболевания (включая контакты по месту жительства, учебы, дружественные, родственные, производственные контакты), не имеющие документального подтверждения перенесенного заболевания кори, не привитые или привитые однократно и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, без ограничения по возрасту и сроку от момента выявления контакта. Учитывая, что корь является высоко контагиозным заболеванием с воздушно-капельным путем передачи, границы очага следует максимально расширять.
 - 2) медицинские работники в возрасте 18-35 лет.

2. После окончания вакцинации контингентов, указанных в п. 1, проводить вакцинацию лиц из групп риска в возрасте 18-35 лет:
 - работники образовательных учреждений
 - работники торговли и транспорта
 - работники общественного питания
 - остальное население

3. Детям, общавшимся с больным корью и имеющим медицинские отводы от профилактических прививок или не достигшим прививочного возраста (от 6 мес. до 12 мес.), вводится иммуноглобулин (в соответствии с инструкцией по его применению) не позднее 5 дня с момента контакта с больным;
 - дети в возрасте от 1 года до 6 лет, имеющие документально подтвержденную вакцинацию считаются привитыми, экстренной вакцинации не подлежат и должны быть затем ревакцинированы по возрасту.

4. Отказ от прививки оформляется в письменном виде по установленной форме с указанием причины;

В случае отказа контактных лиц из числа декретированного контингента (медицинские работники, педагоги, учащиеся школ, дети, посещающие детские дошкольные учреждения), дети не допускаются в организованные коллективы, взрослые отстраняются от работы на срок до 21 дня с момента контакта.

5. Рекомендовать обследовать на напряженность иммунитета к кори беременных из числа контактных с целью оценки риска возможного заражения.

6. Медицинское наблюдение за контактными в очаге кори продолжается в течение 21 дня независимо от прививочного анамнеза.